

2023年医院多发伤应急演练脚本 医院突发食品安全事故应急预案演练脚本(实用5篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

医院多发伤应急演练脚本篇一

医院感染暴发是指在医疗机构或其科室的患者中，短时间内发生3例以上同种同源感染病例的现象。为预防、控制医院感染暴发事件，指导和规范医院感染暴发事件的卫生应急处置工作，保护病人和医务人员身体健康，特制定本预案。

一、成立领导小组

组长：主管业务副院长

组员：医务处、院感科、护理部、感染性疾病科、药剂科及检验科主任

二、医院感染突发事件的报告

1、出现医院感染暴发流行趋势时临床科室医生立即报告科主任，同时上报院感科。

2、经调查证实发生以下情形时：5例以上疑似医院感染暴发；3例以上医院感染暴发应于12小时内报告县卫生局，并向县疾控中心报告。

3、证实发生以下情形时：10例以上的医院感染暴发事件；发

生特殊病原体或者新发病原体的医院感染；可能造成重大公共影响或者严重后果的医院感染。应按照《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范》要求进行报告。

4、确诊为传染病的医院感染，按传染病防治法的有关规定进行报告。

三、出现医院感染暴发事件时，应采取下列感染控制措施：

1、院感科接到报告后，应及时到达现场进行调查处理，采取有效措施，并将调查证实发生的医院感染暴发事件报告院领导。主管院长接到报告后，迅速组织人员开展感染控制及流行病学调查工作，并从人、财、物等方面予以保证，使感染控制有序、高效展开，将受到感染人群缩小到最低范围。

2、医务科负责组织专家进行会诊，协助临床科室查找感染源及传播途径，隔离相关病人，防止感染源的传播及感染范围的扩大。

3、护理部负责协调护理人员，协助做好各项消毒、隔离及病人安置工作。

4、检验科负责各种病原学检测。

5、药剂科、器械科、总务科负责应急物资、药品的准备和发放工作。

6、感染管理科负责流行病学调查：

a□证实医院感染突发事件，对怀疑患有同类感染病例进行确诊。

b□查找感染源：对感染病人、接触者、可疑传染源、环境、物品、医务人员及陪护人员等进行病原学检查。

c□查找引起感染的因素：对感染病人及周围人群进行详细流行病学调查。

d□制定和组织落实有效的控制措施：包括对病人做适当的治疗，进行正确的消毒隔离处理，必要时隔离病人甚至暂停接收新病人。

e□分析调查资料，对病例在科室的分布、人群分布和时间分布进行描述；分析原因，推测可能的感染源、感染途径和感染因素，结合实验室检查结果和采取控制措施的效果综合作出判断。

f□出具调查报告，总结经验，制定防范措施。

四、医院感染暴发的预防措施：

1、开展医院感染的监测：及早发现医院感染流行暴发的趋势，及时采取控制措施。

2、加强临床抗菌药物应用的管理，尤其是某些特殊抗菌药物的应用。

3、加强医院消毒灭菌效果的监督监测。

4、强化医务人员手卫生依从性。

5、加强医源性传播因素的监测和管理，如消毒及无菌操作、消毒产品的管理等。

6、加强重点部门、重点环节、高危人群与主要感染部位的医院感染管理。

7、及时汇总和反馈临床上分离的病原体及其对抗菌药物的敏感性。

8、做好卫生应急物资储备，包括医疗救护的药品及器械、消毒药械、个人防护用品等，以保障卫生应急工作进行。

医院多发伤应急演练脚本篇二

为贯彻落实省委教育工委疫情防控工作领导小组办公室《关于组织开展学校疫情防控工作应急演练的通知》（辽教电〔20**〕29号），为新学期开学做好充分准备，依据《辽宁省中小学(幼儿园)新冠肺炎疫情防控工作指南(试行)》有关要求，结合我园实际，特制定我园疫情防控应急演练实施方案。

组长：园长书记副园长

职责：全面负责疫情防控工作，对防控工作进行决策、指挥，全面实施协调疫情防控工作。

成员：中层干部保教班长厨房负责人

时间：20**年3月17日

地点：幼儿园

幼儿园中层以上领导部分教师、保育员保安

- 1、各部门事先做好演练计划，参加演练人员熟悉相关环节
- 2、各班级、各部门进行幼儿入园前消毒环节、开窗通风。
- 3、厨房消毒擦拭，确保安全卫生。

(一)入园环节

大门前测体温：保健医王春欣测体温，富苗苗记录、赵秀艳喷消毒液，保安隋福开维护秩序，各班级教师负责接体温正

常的幼儿回到班级。

(二) 班级环节

一名教师带领幼儿进入班级，另一名教师再次晨检测体温并记录，小朋友之间保持1.5米的距离坐好，教师组织教学活动，对幼儿教学时。教师随时关注幼儿健康状况，对发热幼儿及时进行应急处理。课堂上保持教室门打开，教室走廊侧内窗户敞开。错时开展活动。以分组教学或区域活动为主。保证上下午适当的户外活动时间，增强幼儿体质，要提醒幼儿，活动时不要聚集，活动结束后各班要错峰有序返回教室。

(三) 就餐环节

1、实行幼儿“分时、分区、分组”就餐制度。每名幼儿保持1.5米距离。

2、教职员工使用各自餐盒独自进餐，保持1.5米距离，回避近距离面对面就餐。

(四) 离园环节

各班级错时分组离园，与家长在门前交接幼儿。

(五) 隔离环节

如发现有幼儿体温超过37.3度，马上隔离并上报上级防疫部门和所属的崔东办事处，并立即将疑似病人送到指定的医院。

医院多发伤应急演练脚本篇三

为进一步做好新型冠状病毒感染预防与控制工作，有效降低新型冠状病毒在医疗机构内的传播风险，规范医务人员行为，提升全员疫情应急处置实战能力，结合医院实际，特组织进

行新型冠状病毒肺炎医院感染暴发应急处置演练。

（一）提高医务人员对新冠肺炎防护的认识，熟悉掌握新冠肺炎医院感染的临床症状、流行病学史以及报告流程，落实消毒隔离措施，增强医院工作人员新冠肺炎医院感染暴发事件的应急防控处置能力，提高感控意识和防护能力，确保“早发现、早隔离、早诊断、早治疗”，减少或降低感染暴发几率。

（二）检验应对医院疫情突发时所需的应急队伍、设备设施、抢救药品、器材、防护用品等方面的准备情况，以便发现不足，及时调整，及时补充，做好应急准备工作。

（三）通过演练进一步明确相关部门和人员的职责任务，加强各部门之间协调配合，完善应急机制，最大限度地降低医院感染对患者造成的危害。

（四）注意事项：

原则上防控处置流程越短、涉及区域和人员越少范围越小，越有利于疫情防控。

医院病区如设立有应急隔离房间，建议在原病区隔离。同时应在医院病区的应急隔离病房区域设置脱隔离服房间，供医护人员脱隔离服、摘口罩。

医院多发伤应急演练脚本篇四

向医院发布公告，该科室暂停接收病员，并对所在科室其他患者及陪护、工作人员进行疏导工作。封闭隔离期间不得外出，拒绝来访，封闭楼层所有通道和电梯，仅保留一台工作人员电梯，要求病区人员不进不出。

由预防保健科协助进行流行病学调查，确定密切接触者和次

密接人数，并将密切接触的工作人员、符合出院条件的患者及其陪护人员转至集中医学观察点进行隔离观察，建议对所有密切接触者进行核酸检测。

预案启动后，各应急处置小组立即组织人员，按照职责分工开展工作，确保封楼层隔离措施及时有序进行，保障患者原发病治疗和护理质量。

启动零报告制度。由该病区护士长每天上午11时前16和下午16时前将当天病区内患者和陪护情况以及工作人员的健康监测情况（主要关注是否有发热及其他新冠症状）电话报医务科。

保卫科立即对呼吸科进行病区楼层封闭，对密切接触患者及家属进行隔离管控，禁止人员出入。

医院多发伤应急演练脚本篇五

为提高医务人员应对新冠肺炎应急处理能力，完善医院各项应急预案和制度，根据《关于印发应对秋冬季新冠肺炎疫情医疗救治工作方案的通知》（联防联控机制医疗发

〔20**〕276号）、《关于印发哈尔滨市应对新冠肺炎局部暴发疫情应急处置预案的通知》（哈疫指发〔20**〕44号）、

《医疗机构消毒技术规范〔ws/t367-20**〕消毒卫生标准》（15982-20**）；《新型冠状病毒肺炎防控方案》（第七版）等文件要求，制定本演练脚本。

ct诊区、医务科、护理部、感染科、总务科、器械科，包括ct诊区全体工作人员、医务科1名、护理部3名、感染科3名、总务科2名、宣传科1名、安保人员2名、器械科1名。

准备一次性工作帽、隔离衣、防护服、医用防护口罩、面屏、洗手液、干手纸巾、速干手消毒液、传递桌、隔离桩、通信工具（手机、固定电话）、空气消毒设备、物体表面擦拭消

毒用品等。

（一）背景设置

20**年7月17日13时，患者王某自诉“咳嗽，咽痛，发热半日”来院就诊。预检分诊护士按照流程引导发热患者及家属到达发热门诊，护士为发热患者采集咽拭子进行新冠核酸检测，检测后进行肺部ct检查□ct检查过程中接到核酸实验室初筛结果阳性电话。

（二）演练流程

13□30p□m——发热门诊护士电话通知ct室做好接诊发热患者准备，并通知保安清道□ct室工作人员接到电话迅速处理好本科室患者相关检查，暂停接诊其他患者，告知排队ct检查的患者及家属尽快撤离ct诊区，关闭患者通道门，将“本诊区有发热患者进行检查，请稍候”的挂牌挂在通道大门处。
（使用专用ct情况下，是否无需此步骤）

13:35p□m——ct室电话通知发热门诊，可护送发热患者来检查。离开发热门诊前护士为发热患者佩戴pe手套。

保安拉警戒线、清道后（发热门诊外围护士与患者保持安全距离）经发热患者转运路线护送患者做ct检查。

14:00p□m——检查中ct技师接到通知患者核酸初筛检测结果阳性□ct技师立即电话告知ct室当班医师。

14:02p□m——ct室接到检测结果信息，工作人员着二级防护后立即封闭ct室诊区，通过电话与外界联系。同时由当班医师向科主任汇报，科主任向感染科及医务科汇报，并通知当日未在岗工作人员在家等候指令。

14:08p□m——ct诊区所有工作人员按规范流程进行二级防护（工作帽、医用防护口罩、隔离衣、一次性乳胶手套和一次性鞋套，面屏、严格执行手卫生），减少非必要诊疗操作。

14:15p□m——对ct诊区环境采样后进行全面消毒：物体表面用1000mg/l含氯消毒液擦拭，地面用1000mg/l含氯消毒液擦拭，仪器设备用75%酒精湿巾进行物表擦拭。开窗通风（注：不要开诊区大门防止空气污染其他区域），所有密闭空间区域用紫外线灯及循环风持续消毒60分钟□ct扫描间□ct候诊区、通往ct室通道等相关区域需指定专人进行消毒）。做好消毒记录，紫外线灯和循环风消毒设备登记累计使用时间，不能超过规定累计时间。

14:18p□m——ct室护士长与护理部电话沟通调配物资（防护用品、消毒药械、诊疗药械等）。医务科向辖区卫生行政部门和疾控部门请示处理意见。

14:20p□m——总务科指定2名工人（防护：工作帽、医用防护口罩、隔离衣、手套、面屏）在封闭诊区大门外2米处安置传递桌（桌面可擦拭消毒，桌上配快速手消毒液）。

14:30p□m——保卫科指定2名安保人员（防护：工作帽、医用防护口罩、隔离衣、手套、面屏）在传递桌以外区域警戒，保证封闭诊区无人员出入，避免无关人员靠近。做好后续诊区人员转移清道、隔离等有关工作。

14:40p□m——物品传递：封闭诊区原则上不允许物品传出（极特殊情况传出物品报告感染科，经指导消毒后传出）。

护理部负责派专人（防护：工作帽、医用防护口罩、隔离衣、手套、面屏）通过传递桌向诊区传递物品，封闭诊区所需物品放置传递桌上后迅速远离，电话通知封闭诊区人员取回，取回人员取走物品后对传递桌表面1000mg/l含氯消毒液擦拭

消毒。

14:45p□m——感控科向医院感染第一责任人报告医院出现阳性病例，指导封闭诊区消毒隔离、医疗废物管理，向上级部门（疾控等相关部门）报告、请示指导消杀隔离，病例诊断后2小时内及时网报传染病报卡，协调诊区监测采样。

根据上级指示转移封闭诊区人员，保卫科负责清道、人员有序安全转移。感控科根据疾控部门指示对封闭诊区环境实施终末消杀、封闭。

保障了医疗安全。需改进措施包括：

1、按照要求发热门诊应独立设置ct□对新型冠状病毒感染或疑似患者扫描专用，不能与其他门诊、急诊及住院患者共用。

如因条件限制无法设置专用ct□应在接受疑似患者检查前疏散常规患者，在疑似患者扫描结束后严格进行设备和空气消毒，再对常规患者进行检查。

建议ct启用自动定位和扫描参数设置功能（如ct具备此功能，技师可以无接触患者情形下，实现患者摆位□ct技师在操作间即可完成患者全程ct检查无需进入ct检查区（抢救病人有风险），可避免与患者接触发生感染风险。

2、此次演练的ct室为非发热患者专用ct室，建议同时明确ct室扫描间消杀工作职责分工（由发热门诊护士完成还是由ct室工作人员完成）。

ct检查要注意患者放射防护安全。检查结束后要为铅服进行消毒，采用2%双链季铵盐湿巾消毒，30分钟后清水擦拭。

3□ct室应配备充足防护物资□ct室扫描技师应规范穿脱防护服，

并设有专用穿脱防护服工作间。

4□ct室发现疑似或确诊新冠肺炎患者应急预案中涉及部门人员电话应上墙公示在醒目位置。

5、对疑似或确诊新冠肺炎患者肺部影像学表现应组织科内及院内专家会诊，并应将结果上报医务科、感染科、主管院长。

6、疑似或确诊新冠肺炎患者离开ct室后，应标明具体消杀时间。